













Mise à jour du 13/11/2013

Petit Déjeuner	Déjeuner et dîner	Collation de 16h
<p>Proposer :</p> <ul style="list-style-type: none">  Boisson chaude café ou thé ou chocolat  1 produit laitier enrichi *  Pain ou biscottes  Beurre, confiture  1 jus de fruit ou 1 compote <p><u>OU</u></p> <ul style="list-style-type: none">  1 bouillie enrichie ®  1 compote ou 1 jus de fruit 	<p>Proposer :</p> <ul style="list-style-type: none">  Le repas préparé par le service de restauration  Enrichir le plat principal ou la soupe ainsi que le dessert ® 	<p>Proposer :</p> <ul style="list-style-type: none">  1 yaourt enrichi ®  1 compote ou 1 jus de fruit  1 gâteau

*Un bol de lait plus 1 cuillère à soupe de poudre de lait entier ou une bouillie plus une cuillère à soupe de crème fraîche ou de poudre de lait entier ou 1 yaourt plus une cuillère à soupe de crème fraîche ou de poudre de lait entier ou du lait et une cuillère à soupe de poudre de lait entier dans la boisson chaude.

®1 cuillère à soupe de crème fraîche ou de poudre de lait entier.

Proposer une collation supplémentaire à 10h et 20h de composition équivalente à celle de 16H.



Si échec du régime enrichi et mise en place par le médecin traitant de compléments alimentaires, privilégier une prise à 10h et 21h à distance des repas.

Page 1/1

<p>Nom :</p> <p>Fonction :</p> <p>Visa :</p>	<p>Rédacteur Dr PINGANAUD, Médecin CO.</p>	<p>Validation Sylvie LACOSTE, Directrice</p>	<p>Conformité à la gestion qualité Audrey TINNES, Chargée Qualité</p>
---	---	---	--